

CONCURSO PÚBLICO – 01/2004

CARGO: _____

NOME CANDIDATO: _____

INSCRIÇÃO: _____

PROVA ESCRITA

01) No Brasil cerca de 18 mil crianças são espancadas diariamente, pelo menos 120 mil crianças morrem anualmente antes de completar 12 meses de vida, estima-se que em cada 100 crianças 41 delas não vão terminar o ensino fundamental (Revista Isto é, 12/07/00). Em 2000, a Lei nº 8.069 que as protege completou 10 anos. A Lei em questão é conhecida como:

- A) () Código do Consumidor.
- B) () Código do Menor.
- C) () Estatuto da criança e do Adolescente.
- D) () Código da Febem.
- E) () Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

02) O nome correto do nosso País:

- A) () Brasil.
- B) () República Federativa do Brasil.
- C) () República dos Estados Unidos do Brasil.
- D) () República do Brasil.
- E) () República Democrática do Brasil.

3) O atual governador do Estado de Santa Catarina é:

- A) () Luiz Inácio Lula da Silva.
- B) () Volnei Morastoni.
- C) () Espiridião Amim.
- D) () Luiz Henrique da Silveira.
- E) () Eduardo Pinho Moreira.

4) O Mercosul é um bloco econômico formado por Países da América do Sul que são:

- A) () Brasil, Bolívia, Canadá e Uruguai.
- B) () Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
- C) () Argentina, Bolívia, Estados Unidos e China.
- D) () Chile, Canadá, Brasil e Espanha.
- E) () Estados Unidos, Espanha, Chile e China.

5) As estatísticas populacionais no Brasil indicam uma mudança significativa no perfil da população do país. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até o ano 2025, o Brasil será o sexto país do mundo com o maior número de pessoas idosas. Em 2003 foi sancionada a Lei 10.741, que objetiva regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, esta lei é conhecida como:

- A) () Estatuto da Criança e do Adolescente.
- B) () Estatuto da maioridade.
- C) () Lei da Educação de Adultos.
- D) () Lei Orgânica da Saúde.
- E) () Estatuto do Idoso.

6) O código de Ética de Enfermagem estabelece as diretrizes para o exercício profissional da equipe de enfermagem. A Lei 7498/96 em seu artigo 13, considera como atividades do auxiliar de enfermagem:

- A) () Participar da equipe de saúde; prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública.
- B) () Participar da equipe de saúde; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
- C) () Prestar cuidados de higiene e conforto; participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- D) () Prestar cuidados de higiene e conforto, assistência à parturiente e ao parto normal.
- E) () Acompanhamento pré-natal de baixo e alto risco; consulta de enfermagem; gerencia dos serviços de saúde.

7) Em relação à Reforma Sanitária, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- A) () A VIII Conferência Nacional de Saúde serviu como marco para a implantação do Sistema Único de Saúde.
- B) () A saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso à serviços de saúde.
- C) () A saúde, à partir da Constituição de 1988, é encarada como “direito de todos e dever do Estado”.
- D) () A centralização das ações de saúde é a forma de gerenciamento mais adequada para melhorar a qualidade da assistência.
- E) () Os serviços de saúde prestados à população por órgãos e instituições públicas constituem o SUS.

8) A Lei 8080, de 1900, destaca como um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), a “Universidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência”. Este princípio garante:

- A) () Atendimento ao homem como ser integral, voltado para a promoção e recuperação da saúde.
- B) () Atenção à saúde, a todo cidadão, por parte do sistema, tanto público como aqueles contratados.
- C) () Organização dos serviços de saúde em níveis de complexidade crescente, dispostos numa área geográfica delimitada.
- D) () Ações e serviços em todos os níveis, de acordo com a complexidade de cada caso.
- E) () Reordenação dos serviços de saúde privados.

9) A Vigilância Epidemiológica tem papel fundamental no controle das doenças transmissíveis porque:

- A) () Sua ação permite o isolamento e a internação imediata dos doentes.
- B) () Sua ação nos hospitais permite separar os pacientes mais graves e que necessitam de maior atenção.
- C) () Sua ação tem por finalidade recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- D) () Sua ação ocorre especificamente no controle das doenças preveníveis por vacinas.
- E) () Sua ação permite o controle das doenças crônico-degenerativas.

10) Entre os objetivos dos Programas de Saúde do Ministério da Saúde, podemos afirmar:

- A) () O Programa de Atenção Integral à saúde da Mulher (PAISM), tem por objetivo atender todas as mulheres independente da idade.
- B) () O Programa de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer de Colo Uterino e Mamas, objetiva reduzir as taxas de mortalidade e natalidade materna.
- C) () O Programa de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST/AIDS tem por objetivo diminuir a morbidade e mortalidade pelo HIV/AIDS.
- D) () O Programa Nacional de Imunização (PNI), tem por objetivo reduzir a morbidade e a mortalidade da população menor de cinco anos, gestantes e outros grupos através da vacinação.
- E) () O Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) tem por objetivo o controle das condições de saneamento que afetam o estado de saúde da população.

11) O Programa Saúde da Família tem por objetivos:

- A) () promover assistência à população de forma ampliada, direta e integral, tendo a família como objeto e o domicílio como espaço de atuação.
- B) () Promover assistência à população carente de forma ampliada e integral, tendo a mulher e a criança como objetivo de atenção principal.
- C) () Promover a assistência à população em geral, privilegiando os mais carentes, idosos e crianças.
- D) () Promover e controlar o estado de saúde da população através do combate as doenças da infância.
- E) () Promover assistência à família e indivíduos inscritos nos Programas Oficiais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

12) Entre os objetivos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), destacam-se:

- A) () Conhecer o perfil epidemiológico nutricional da população materno-infantil, e estabelecer programas de intervenção e recuperação nutricional.
- B) () Diminuir as taxas de morbidade e mortalidade entre crianças e idosos.
- C) () Controlar a taxa de mortalidade infantil ocasionada por problemas nutricionais e por distúrbio gástricos.
- D) () Conhecer os problemas nutricionais da população, bem como os cardápios regionais.
- E) () estabelecer critérios nutricionais à população, respeitando hábitos regionais.

13) Assinale a terminologia definida corretamente:

- A) () Desinfecção concorrente é o processo de destruição de microorganismos na forma vegetativa e usada em seres vivos.
- B) () Endemia é a ocorrência, numa coletividade ou região, de casos de uma mesma doença em número acima da incidência normalmente esperada.
- C) () Profilaxia é o conjunto de medidas que tem por finalidade prevenir ou atenuar a doença, suas complicações e conseqüências.
- D) () Notificação compulsória é a comunicação de casos clínicos de doenças chamadas de "notificação compulsória" aos jornais e a imprensa em geral.
- E) () Prevenção são medidas que objetivam o tratamento imediato das doenças em nível hospitalar.

14) Entre as medidas de controle do paciente, contatos e meio ambiente imediato dos indivíduos com HIV/AIDS, identifique nas afirmativas abaixo, a alternativa que corresponde as ações a serem realizadas pela equipe de saúde.

- A) () Notificação dos casos ao serviço de Vigilância Epidemiológica e isolamento do paciente até sua transferência para o hospital.
- B) () Notificação dos casos ao serviço de Vigilância Epidemiológica, desinfecção concorrente do material, equipamentos e área física contaminados por sangue e secreções.
- C) () Informar a comunidade e investigar contatos.
- D) () Informar a comunidade e isolamento do paciente e família.
- E) () Notificação dos casos a autoridade policial, esterilização de materiais e área física contaminados por sangue e secreções.

15) Considerando as alternativas abaixo, assinale a que **NÃO** corresponde as precauções universais de biosegurança:

- A) () Não recapar agulhas, dobrar ou quebrar agulhas utilizadas nos procedimentos.
- B) () Usar máscaras e óculos ou visor quando houver risco de contaminação de mucosas da face (olho, boca, nariz) com respingos de sangue ou outras secreções.
- C) () Usar luvas ao manipular sangue e/ou secreções e sempre que houver possibilidade de contato com matéria orgânica.
- D) () Evitar ruído desnecessário; falar com voz baixa ou moderada; ser cordial durante a execução dos procedimentos.
- E) () Hipertensão, conforme a Organização Mundial de Saúde, é uma alteração da pressão arterial encontrada quando os valores estão acima, ou iguais a 200 X150 mmHg.

16) A Nebulização ou Inalação tem por objetivo:

- A) () Fluidificar secreções aderidas na parede brônquica ou promover a broncodilatação.
- B) () Fluidificar secreções aderidas na parede brônquica, e através da gravidade auxiliar a remoção de secreções orofaríngea.
- C) () retirada de secreções nasais e traqueais através da aspiração.
- D) () Remover fluídos pulmonares e sangüíneos.
- E) () Aspirar secreções traqueobrônquicas.

17) Segundo os locais de aplicação de injeção intramuscular podemos afirmar:

- A) () A região da face antero-lateral da coxa ou músculo vasto lateral é contra-indicada para crianças até 10 anos.
- B) () A região ventro-glútea ou hochstetter é indicada em qualquer idade.
- C) () A região dorso-glútea é indicada para qualquer idade.
- D) () A região deltoidiana é indicada para crianças menores de 10 anos.
- E) () A região deltóidea e dorso-glútea são contra indicadas para idosos e adolescentes.

18) Em relação aos cuidados ao realizar um curativo é correto afirmar:

- A) () Ao realizar um curativo não deve-se misturar pinças, reservando-se sempre uma pinça para o próximo passo.
- B) () Curativos de ferimentos que estejam drenando devem ser trocados uma vez ao dia.
- C) () Em caso de curativos com dreno, deve-se primeiro realizar este e por ultimo o da incisão.
- D) () Em curativos, onde não há prescrição médica ou rotinas estabelecidas para o mesmo, dever-se-á usar, de preferência, pomadas com efeito cicatrizante.
- E) () Curativos de feridas limpas devem ser trocados 2 vezes ao dia.

19) Em relação à aplicação de bandagens, deve-se:

- A) () Aplicar a atadura no sentido da circulação arterial.
- B) () Trocar a atadura se estiver suja com secreção, sem necessidade de realizar novo curativo.
- C) () A atadura deverá ficar bem apertada pois não causará dano a circulação.
- D) () Aplicar sempre uma volta tipo oito ao iniciar a bandagem.
- E) () O local onde será aplicada a atadura deverá estar limpo e seco.

20) Em relação à cadeia epidemiológica das doenças podemos afirmar:

- A) () Agente causal: pode ser qualquer substância capaz de impedir um processo de doença.
- B) () Ciclo evolutivo: é a forma como os agentes manifestam a doença no organismo humano.
- C) () Vias de transmissão: são os modos de transferência dos agentes, os quais podem ser através de imunidade ativa ou passiva.
- D) () Reservatório: é o local onde o agente irá se alojar, podendo ser na pele, no intestino ou no sangue.
- E) () Porta de entrada do hospedeiro: é o local ou via usada para a entrada do agente causador da doença, que pode ser respiratória, intestinal, pele, mucosa e sangue.

21) Dentre as atribuições do auxiliar de enfermagem nos Serviços e Programas de Saúde, podemos enumerar:

- A) () Controlar a rede de frio e seu sistema de manutenção, bem como realizar visita domiciliar e participar na elaboração e operacionalização do sistema de referência e contra-referência.
- B) () Planejar, organizar e coordenar os serviços de assistência de enfermagem, realizar controle e busca de faltosos, participar de mapeamento da área de abrangência do centro de saúde.
- C) () Participar na elaboração e operacionalização do sistema de referência e contra-referência e planejar, organizar e coordenar os serviços de assistência de enfermagem.
- D) () Realizar visita domiciliar, controle e busca de faltosos, controlar rede de frio e seu sistema.
- E) () Realizar orientações no puerpério e pré-natal, realizar partos no domicílio e consulta de enfermagem às crianças.

22)Objetivando a correta conservação das vacinas no refrigerador, identifique nas alternativas abaixo, qual (is) do (s) procedimento (s), estão corretos:

- A) () Manter regulagem da temperatura das vacinas no refrigerador de modo que permaneça entre 4° C a 10° C.
- B) () As vacinas podem ser guardadas nas prateleiras, na porta e na parte de baixo do refrigerador.
- C) () Deve-se verificar e controlar a temperatura do refrigerador a cada 15 dias;a temperatura da caixa térmica deve ser constante; portanto, não trocar o gelox até o termino das atividades diárias.
- D) () A temperatura do refrigerador deve ser controlada a cada 2 horas e os diluentes que serão usados não devem ser colocados no refrigerador.
- E) () Colocar na frente os produtos com prazo de validade mais próximo do vencimento; os diluentes devem ser colocados no refrigerador, pelo menos seis horas antes do uso.

23)O teste do pézinho, permite o diagnóstico precoce de:

- A) () Hipotireoidismo Congênito, Fenilcetonúria, Hiperplasia Adrenal Congênita e Fibrose Cística.
- B) () Hipotireoidismo Congênito, Sífilis Congênita, HIV/AIDS e Fibrose Cística.
- C) () Fenilcetonúria, doenças congênitas, HIV/AIDS e Sífilis Congênita.
- D) () Fenilcetonúria, Diabetes Juvenil, Fibrose Cística e doenças congênitas.
- E) () Hiperplasia Adrenal Congênita, Diabetes Juvenil e Doenças Crônico-Degenerativas.

24)As vacinas utilizadas rotineiramente, pelo programa de imunização nos dois primeiros meses de vida da criança são:

- A) () Sabin, Tríplice (DPT), trivial e Anti-Sarampo.
- B) () Haemophilus Influenzae Tipo B, BCG, Anti-Sarampo e Dupla Infantil.
- C) () Dupla Infantil, BCG, Trivial e Anti-Sarampo.
- D) () Sabin, Tríplice (DPT), BCG, Hepatite B e Haemophilus Influenzae Tipo B.
- E) () Haemophilus Influenzae Tipo B, Trivial e Tríplice (DPT).

25)As atividades de **Prevenção** da hipertensão arterial, devem contemplar orientações em relação:

- A) () Controle do estado de saúde, uso de dieta hipocalórica, uso de medicação prescrita; controle de peso e stress.
- B) () Controle do estado de saúde, realização correta de exercícios físicos, controle de peso, diminuição do stress e não utilização de drogas.
- C) () Participar de grupos de hipertensos, prescrição de medicação e controle de peso.
- D) () Participar de grupos de hipertensos, realização correta de exercícios e uso de dieta hipocalórica.

E) () Controle médico, uso de medicação e dieta hipoglicêmica; tratamento hospitalar.

26) As ações do auxiliar de enfermagem durante a assistência pré-natal, são:

A) () Manter em ordem documentação da gestante, exame físico e consulta de enfermagem; aconselhamento pré e pós-teste Anti-HIV na gravidez.

B) () Recepcionar a gestante na unidade de saúde; controle de peso; altura; exame físico e ginecológico; orientação sobre os cuidados durante a gravidez.

C) () Recepcionar a gestante na unidade de saúde; controle de peso, altura e pressão arterial; entrega de medicamentos; orientar sobre os exames solicitados.

D) () Manter em ordem documentação da gestante; exame clínico e obstétrico; realizar o parto e aconselhamento pré e pós-teste Anti-HIV na gravidez.

E) () Orientar gestante de baixo e alto risco; acompanhamento durante parto e consulta médica.

27) A infecção puerperal caracteriza-se por infecção local ou geral que surge no puerpério, após abortamento ou parto, tendo como ponto de partida o aparelho genital. A mesma pode ser evitada através de cuidados obstétricos adequados e tratamento de infecções, para tanto, o auxiliar de enfermagem, ao atender a mulher na unidade de saúde, deverá:

A) () Reconhecer sinais e sintomas de infecção, encaminhar casos suspeitos à enfermeira, prescrever medicamentos e curativos.

B) () Reconhecer sinais e sintomas de infecção, encaminhar a enfermeira os casos suspeitos, administrar medicamentos se prescritos e realizar curativos.

C) () Realizar exame na puerpera, curativo, administrar medicação ocitócica, realizar massagens no abdome.

D) () Realizar exame na puerpera, realizar curativo, prescrever medicação e massagens no abdome.

E) () Acompanhar a gestante no domicílio e ambulatório, prescrever medicação tópica a ser usada na lesão e fazer curativo.

28) A diarreia pode ser aguda, prolongada e crônica, podendo levar a criança a desenvolver desidratação e desnutrição. A mãe nestes casos deverá ser orientada para não deixar de amamentar, porque:

A) () O leite materno tem nutrientes, enzimas, micronutrientes e líquidos.

B) () O leite materno inibe a ação de ácidos graxos, bem como o aumento do bolo fecal.

C) () A afirmação acima é incorreta, pois uma das primeiras condutas é orientar a mãe para não amamentar.

D) () O leite materno oferece líquidos e impede a ação de nutrientes e enzimas.

E) () O leite materno fornece sais minerais e vitaminas que irão contribuir no processo de envelhecimento das células.

29) Uma criança foi ao posto de saúde com a seguinte prescrição médica: garamicina 15 mg, IM. Você tem no posto somente ampolas de garamicina de 80 mg, com dois ml. Quantos ml você administrará?

- A) () 2,66 ml.
- B) () 1,10 ml.
- C) () 0,37 ml.
- D) () 0,55 ml.
- E) () 0,28 ml.

30) Para a verificação de Medidas Antropométricas em crianças, é correto afirmar:

- A) () O peso da criança pode ser verificado em qualquer horário, o perímetro permite detectar anomalia cerebral; para medir a altura da criança até dois anos, usa-se balança antropométrica.
- B) () Para medir o perímetro torácico, usa-se a fita métrica; o peso em criança até dois anos é feito com o antropômetro e para verificar a altura em crianças maiores de dois anos, usa-se a balança antropométrica.
- C) () Para verificar a altura em crianças até dez anos, usa-se a régua antropométrica; para o peso, a balança tipo plataforma e para o perímetro cefálico a fita métrica.
- D) () Para verificar o peso da criança até um ano de idade, utiliza-se a balança de mesa/balança de prato; para medir a estatura até dois anos de idade usa-se de preferência a régua antropométrica.
- E) () Para medir o perímetro torácico, usa-se o antropômetro e para o peso a fita métrica.

31) A Rubéola Congênita poderá causar nos bebês:

- A) () Abortos, Fibrose Cística, Lesões Hepáticas, Lesões Renais e Cegueira.
- B) () Cardiopatias Congênitas, Abortos, Hipertonia Torácica e dos Músculos, Lesões Renais e Hérnias.
- C) () Surdez, Abortos, Encefalopatia Aguda, Convulsões e Paralisias, Desidratação.
- D) () Miocardite, Polineurite, Cegueira, Insuficiência Respiratória.
- E) () Retardamento Mental, Abortos, Natimortos, Surdez, Cardiopatias Congênitas e Cegueira.

32) Em relação ao aleitamento materno é correto afirmar:

- A) () O leite materno atende a todas as necessidades nutricionais da criança até 6 meses de vida, e é ideal para crianças até os 2 anos de idade ou mais.
- B) () O bebê aproveita melhor o leite materno em função da pouca quantidade de água.
- C) () O leite materno juntamente com o leite de vaca contem todos os nutrientes que a criança precisa.
- D) () O leite materno poderá ser usado até os 6 anos de idade.
- E) () O leite materno protege o bebê de infecções, não havendo necessidade do uso de vacinas.

33) O cartão da criança foi feito para acompanhar o desenvolvimento e a saúde da criança até os cinco anos de idade. Em relação aos dados a serem anotados no cartão, assinale aquele que **NÃO** é necessário ser registrado no cartão:

- A) () Dados de identificação e do nascimento da criança.
- B) () Indicadores do desenvolvimento da criança: peso e atividade.
- C) () Doenças da família.
- D) () Vacinas da criança.
- E) () Doenças da criança.

34) Ao orientar um paciente que fará uso de Xarope, você deverá entre outros cuidados salientar que:

- A) () A pessoa deverá ingerir água ou outro líquido 1 (uma) hora antes de tomar o Xarope.
- B) () A pessoa deverá ficar sem se alimentar 1 (uma) hora antes de tomar o Xarope.
- C) () A pessoa deverá abster-se de tomar líquidos pelo menos 1 (uma) hora após tomar o Xarope.
- D) () A pessoa não poderá tomar nenhum medicamento junto com o Xarope.
- E) () A pessoa deverá ficar em jejum até 5 (cinco) horas após tomar o Xarope.

35) O teste tuberculínico (PPD) é realizado em pacientes com suspeita de tuberculose, é feito utilizando-se a via:

- A) () Oral.
- B) () Intramuscular.
- C) () Intradérmica.
- D) () Endovenosa.
- E) () Subcutânea.

36) No período de 7 a 11 de dezembro de 2003, foi realizado em Brasília a 12ª Conferência Nacional de Saúde, que teve como tema central:

- A) () Direito a Saúde.
- B) () Saúde e Cidadania.
- C) () Informação e Comunicação em Saúde.
- D) () Segurança e a Saúde.
- E) () A Saúde que Temos- o SUS que Queremos.

37) O diabetes mellitus é uma doença que exige toda uma vida de comportamentos especiais de autocuidado para que a glicemia seja mantida o mais próximo possível da normalidade. Em relação a monitorização da glicemia, os exames e testes usados com maior frequência são:

- A) () Glicemia capilar e parcial de urina.
- B) () Hemograma e colesterol.
- C) () Glicemia capilar e triglicérides.
- D) () Glicemia capilar e glicosúria.

E) () Hemograma e glicosúria.

38)Dentre as principais medidas de combate às doenças infecciosas e parasitárias, destacam-se:

- A) () Saneamento básico, controle do tabagismo e prostituição.
- B) () Controle de vetores (insetos e roedores), das drogas e de pacientes hipertensos.
- C) () Saneamento das escolas, de vetores (insetos e roedores), de prostíbulos e crianças pobres.
- D) () Controle dos indivíduos doentes, de crianças pobres e das famílias sem teto.
- E) () Saneamento básico e higiene pessoal.

39)Assinale a alternativa correta, quanto as variações patológicas que podem ser encontradas quando da verificação dos sinais vitais:

- A) () Hipertermia corresponde a elevação da temperatura quando encontramos valores acima de 36° C.
- B) () Taquisfigmia corresponde a elevação do pulso; em crianças esta alteração é determinada quando encontramos valores acima de 80 bcpm.
- C) () Bradipnéia é a diminuição do número de movimentos respiratórios em adultos; esta alteração é encontrada quando temos valores abaixo de 60 mrpm.
- D) () Hipotensão, conforme a Organização Mundial de Saúde, é uma alteração da pressão arterial encontrada quando os valores estão abaixo, iguais ou menores que 100 x 60 mmHg.
- E) () Hipertensão, conforme a Organização Mundial de Saúde, é uma alteração da pressão arterial encontrada quando os valores estão acima, ou iguais a 200 x 150 mmHg.

40)Ao administrar drogas por via Endovenosa e for detectado presença de hematoma, dor, hiperemia ou edema; a conduta a ser tomada é:

- A) () Introduzir rapidamente o resto da medicação.
- B) () Parar a administração do medicamento e aplicá-lo por outra via, de preferência intramuscular (IM).
- C) () Retirar a agulha e puncionar novamente em outro local.
- D) () Manter a administração e orientar o paciente para fazer aplicação de compressas quentes em casa.
- E) () Introduzir lentamente a medicação e aplicar compressa de gelo no local.